

VILLISIAN IÄNMÄÄRITYS


TUNNISTA SAMANA VUONNA SYNTYNYT PORSAS, YLIVUOTINEN JA YLI 2-VUOTIAS VILLISIKA

- Villisian iänmääritys perustuu hammaskehitykseen eli maitohampaiden vaihtumiseen pysyviksi hampaiksi.
- Alaleuan kaikki maitohampaat ovat vaihtuneet pysyviksi noin kahden vuoden iässä. Alahampaiden perusteella ikä on määritettävissä muutamman kuukauden tarkkuudella kahteen ikävuoteen saakka.
- Saaliista on melko helposti eroteltavissa samana vuonna syntyneet porsaas, ylivuotiset ja yli 2-vuotiaat eläimet.
- Ikää määrittäessä kannattaa ensimmäisenä tarkastella alaeuhampaiden kehitystä. Tukea iänmääritykseen saa alaposkihampaita tarkastelemalla.

Aikuisten villisikojen iänmääritystä ei tässä ohjeessa käsitellä.

Ohjeessa maitohampaita merkitään pienellä kirjaimella (esim. i) ja pysyviä hampaita isolla (esim. I).

PYSYVÄT ALAHAMPAAT



ALAEUHAMPAAT

3–5 mm




MAITOHAMPAITA

Maitohampaat ovat poikkileikkaukseltaan pyöreähköt, hieman kellertävät ja leveydeltään 3–5 mm. Laitimmainen etuhammas (i3) on ohut ja melko tasapaksu.


Pysyvät hampaat ovat varsinkin kärjestään maitohampaita litteämpiä ja leveämpiä. Hammasluu on maitohampaita vaaleampaa. Pysyvien hampaiden leveys on 5–8 mm. Laitimmainen etuhammas (I3) on tyveltään maitohammasta leveämpi ja kapenee ulkosyrjältään selvästi hampaan kärkeä kohti.

5–8 mm




PYSYVIÄ HAMPAITA

ALAEUHAMPAIDEN KEHITYS




N. 6 KK

Noin 6 kuukauden ikäisellä porsaalilla kaikki hampaat, i3 mukaan lukien, ovat maitohampaita. Kuvan yksilöllä puuttuu vasemmanpuoleinen i3.



13–15 KK

13–15 kuukauden ikäisellä villisialla pysyvät keskimmäiset etuhampaat (I1) ovat juuri alkaneet kasvaa. Toiset etuhampaat (i2) ovat vielä maitohampaita.




15–16 KK

15–16 kuukauden ikäisellä villisialla laitimmaisat (I3) ja keskimmäiset (I1) etuhampaat ovat vaihtuneet pysyviksi. Ainoastaan toiset etuhampaat (i2) ovat vielä maitohampaita.



18–20 KK


18–20 kuukauden ikäisellä villisialla kaikki alaeuhampaat ovat vaihtuneet pysyviksi. Toiset etuhampaat (I2) eivät ole vielä kasvaneet täyteen mittaansa, vaan ovat keskimmäisiä etuhampaita (I1) lyhyemmät.



21–24 KK

Noin kaksivuotiaalla villisialla kaikki etuhampaat ovat pysyviä hampaita ja täydessä mitassaan.


ALAPOSKIHAMPAIDEN KEHITYS



8–10 KK


M1

Noin 8–10 kuukauden ikäisellä porsaalilla M1 on kasvanut täyteen mittaansa, mutta M2 ei ole vielä puhjennut.



10–16 KK

M2 puhkeaa tyypillisesti 10–16 kuukauden iässä.



20–22 KK

20–22 kuukauden ikäisellä villisialla M3 on juuri puhjennut ja P2–P4 ovat pysyviä hampaita.